



БРУФЕН® РАПІД (BRUFEN® RAPID)

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу



12+

Бруфен® Рапід у формі капсул має у своєму складі 400 мг ібупрофену, який зменшує прояви запалення та болю у дорослих і дітей з 12-ти років.




max
1200
мг

Рекомендовано приймати **по одній капсулі кожні 6 годин** під час та після їжі, запиваючи достатньою кількістю води та попередньо не розжувуючи. Добова доза не повинна перевищувати **1200 мг**.



Препарат показаний для **полегшення різного виду болю: головного, зубного, меністрального, у тому числі при застуді та лихоманці**.



СКЛАД

діюча речовина: ібупрофен; 1 капсула м'яка містить ібупрофену 400 мг;

допоміжні речовини: магногел (поліетиленгліколь 600), каліє гідроксид (чистота 85 %), вода очищена;

оболонка капсули: желатин, сорбіт розчин насткової дегідратованій (E 420), вода очищена.

ЛІКАРСЬКА ФОРМА

Капсули м'які:

Основні фізико-хімічні властивості:

блідо-жовтої кольору прозорі м'які желатинові капсули овалної форми, розміром 14 тіпіш, з прозорим вмістом та написом «#», надрукованим блідо фарбю.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Нестероїдні протизапальні і противимітальні засоби.

Походіні тропіонової кислоти.

Ібупрофен. Код ATХ MoA Е01.

01 ПОКАЗАННЯ

04 ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

06 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

02 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

05 ВЗАЄМОДІЯ ЗІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ




07 ПЕРЕДОЗУВАННЯ

03 ПРОТИПОКАЗАННЯ

08 ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

01 ПОКАЗАННЯ

Симптоматичне лікування легкого та помірного болю різного походження



В тому числі при застуді та лихоманці

[К на початок](#)

02 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Застосування внутрішньо діоресом та дітям віком від 12 років з масою тіла > 40 кг. Тільки для короткотривалого застосування. Небажані ефекти можна мінімізувати шляхом застосування найвищої ефективної дози протягом найкоротшого періоду часу, необхідного для контролю симптомів (див. розділ « Особливості застосування »).

Разова доза для дітей віком від 12 років з масою тіла > 40 кг і дорослих становить **1 капсулу (400 мг ібупрофену)**. У разі необхідності можна застосовувати по 1 капсулі кожні 6 годин. Максимальна добова доза становить 1200 мг (3 капсули на добу). Застосування мінімально ефективної дози, потрібні для лікування симптомів, протягом найкоротшого періоду часу (див. розділ « Особливості застосування »).

Максимальна доза (на добу)	1200 мг
Мінімальна доза (на добу)	400 мг

03 ПРОТИПОКАЗАННЯ

04 ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

06 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

05 ВЗАЄМОДІЯ ЗІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

07 ПЕРЕДОЗУВАННЯ

08 ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

01 ПОКАЗАННЯ

Симптоматичне лікування легкого та помірного болю різного походження

02 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Застосування внутрішньо діоресом та дітям віком від 12 років з масою тіла > 40 кг. Тільки для короткотривалого застосування. Небажані ефекти можна мінімізувати шляхом застосування найвищої ефективної дози протягом найкоротшого періоду часу, необхідного для контролю симптомів (див. розділ « Особливості застосування »).

Разова доза для дітей віком від 12 років з масою тіла > 40 кг і дорослих становить **1 капсулу (400 мг ібупрофену)**. У разі необхідності можна застосовувати по 1 капсулі кожні 6 годин. Максимальна добова доза становить 1200 мг (3 капсули на добу). Застосування мінімально ефективної дози, потрібні для лікування симптомів, протягом найкоротшого періоду часу (див. розділ « Особливості застосування »).

Мінімальна доза (на добу)

1200 мг

03 ПРОТИПОКАЗАННЯ

04 ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

06 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

05 ВЗАЄМОДІЯ ЗІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

07 ПЕРЕДОЗУВАННЯ

08 ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

01 ПОКАЗАННЯ

Симптоматичне лікування легкого та помірного болю різного походження

02 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Застосування внутрішньо діоресом та дітям віком від 12 років з масою тіла > 40 кг. Тільки для короткотривалого застосування. Небажані ефекти можна мінімізувати шляхом застосування найвищої ефективної дози протягом найкоротшого періоду часу, необхідного для контролю симптомів (див. розділ « Особливості застосування »).

Разова доза для дітей віком від 12 років з масою тіла > 40 кг і дорослих становить **1 капсулу (400 мг ібупрофену)**. У разі необхідності можна застосовувати по 1 капсулі кожні 6 годин. Максимальна добова доза становить 1200 мг (3 капсули на добу). Застосування мінімально ефективної дози, потрібні для лікування симптомів, протягом найкоротшого періоду часу (див. розділ « Особливості застосування »).

03 ПРОТИПОКАЗАННЯ

04 ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

06 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

05 ВЗАЄМОДІЯ ЗІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

07 ПЕРЕДОЗУВАННЯ

08 ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

01 ПОКАЗАННЯ

Симптоматичне лікування легкого та помірного болю різного походження

02 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Застосування внутрішньо діоресом та дітям віком від 12 років з масою тіла > 40 кг. Тільки для короткотривалого застосування. Небажані ефекти можна мінімізувати шляхом застосування найвищої ефективної дози протягом найкоротшого періоду часу, необхідного для контролю симптомів (див. розділ « Особливості застосування »).

Разова доза для дітей віком від 12 років з масою тіла > 40 кг і дорослих становить **1 капсулу (400 мг ібупрофену)**. У разі необхідності можна застосовувати по 1 капсулі кожні 6 годин. Максимальна добова доза становить 1200 мг (3 капсули на добу). Застосування мінімально ефективної дози, потрібні для лікування симптомів, протягом найкоротшого періоду часу (див. розділ « Особливості застосування »).

03 ПРОТИПОКАЗАННЯ

04 ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

06 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

05 ВЗАЄМОДІЯ ЗІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

07 ПЕРЕДОЗУВАННЯ

08 ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

01 ПОКАЗАННЯ

Симптоматичне лікування легкого та помірного болю різного походження

02 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Застосування внутрішньо діоресом та дітям віком від 12 років з масою тіла > 40 кг. Тільки для короткотривалого застосування. Небажані ефекти можна мінімізувати шляхом застосування найвищої ефективної дози протягом найкоротшого періоду часу, необхідного для контролю симптомів (див. розділ « Особливості застосування »).

Разова доза для дітей віком від 12 років з масою тіла > 40 кг і дорослих становить **1 капсулу (400 мг ібупрофену)**. У разі необхідності можна застосовувати по 1 капсулі кожні 6 годин. Максимальна добова доза становить 1200 мг (3 капсули на добу). Застосування мінімально ефективної дози, потрібні для лікування симптомів, протягом найкоротшого періоду часу (див. розділ « Особливості застосування »).

03 ПРОТИПОКАЗАННЯ

04 ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

06 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

05 ВЗАЄМОДІЯ ЗІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

07 ПЕРЕДОЗУВАННЯ

08 ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

01 ПОКАЗАННЯ

Симптоматичне лікування легкого та помірного болю різного походження

02 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Застосування внутрішньо діоресом та дітям віком від 12 років з масою тіла > 40 кг. Тільки для короткотривалого застосування. Небажані ефекти можна мінімізувати шляхом застосування найвищої ефективної дози протягом найкоротшого періоду часу, необхідного для контролю симптомів (див. розділ « Особливості застосування »).

Разова доза для дітей віком від 12 років з масою тіла > 40 кг і дорослих становить **1 капсулу (400 мг ібупрофену)**. У разі необхідності можна застосовувати по 1 капсулі кожні 6 годин. Максимальна добова доза становить 1200 мг (3 капсули на добу). Застосування мінімально ефективної дози, потрібні для лікування симптомів, протя