БРУФЕН® (BRUFEN®)

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу

Бруфен® у формі сиропу має з своєму складі Ібупрофен, який поширює дорослим заходити на болю у дітей з 3 місячного віку.

Дозування потрібно розраховувати відповідно до ваги та віку дитини. Добова доза становить **20 мг/кг** ваги дитини, тобто для дитини **10 кг** ваги це 200 мг ібупрофену, що дорівнює 10 мл сиропу.

Препарат показаний **для короткочасного лікування лихоманки та болю у дітей.**

Короткочасне лікування проявляється на болю у дітей.

01 ПОКАЗАННЯ
02 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ
03 ПРОТИПОКАЗАННЯ
04 ФАРМАКОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
05 ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ТА ІНШІ ВИДИ ВЗАЄМОДІЙ
06 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
07 ПЕРЕДУВАННЯ
08 ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

СКЛАД

діюча речовина: Ібупрофен;
1 мл сиропу містить ібупрофену 100 мг;

допоміжні речовини:
метилпарагідроксибензоат (E 218), пропілпарагідроксибензоат (E 216), натрію лимонна, монодигліцеридні ацетилові, гліцерин, сорбітол рідкий, цукор (не перетворений), (E 420), сукроза, натрію бензоат (E 211), ароматизатор: жовтий (E 102), ароматизатор: ванілін, ароматизатор: полісорбат, вода очищена.

ЛІКАРСЬКА ФОРМА

Сироп

Основні фізико-хімічні властивості:
сиропоподібна суспензія однакового вигляду з виглядом запахом.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби.
Похідні пропіонової кислоти. Ібупрофен. Код АТХ M01 Ex.

К. На початок

01 ПОКАЗАННЯ

Короткочасне лікування проявляється на болю у дітей.

К. На початок

02 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Дози. Тільки для перорального прийому. Із короткочасного застосування. Небажані ефекти можна мінімізувати останнім ефективним лікарським засобом у найнижчій ефективній дозі, необхідною для усунення скарг. Дози дорослі: «Особливості застосування». Діти Ібупрофен залежить від віку та ваги. Рекомендована добова доза становить 20 мг/кг ваги дитини. Інтервал терапевтичних доз: від 20 мг/кг. Рекомендовані разові дози: 5 мг/кг, при потребі до 10 мг, не забуваючи перевищити добовою дозою. Максимальна разова доза: 10 мг/кг. Максимальна добова доза: 30 мг/кг. Для дозування разової дози добову дозу слід розділити на 3 прийоми.

Бруфен®, сироп: до 10 мл, не рекомендований для застосування у дітей віком до 3 місяців (10 мл).

Сироп можна застосовувати, використовуючи мірний ложку, що знаходиться у упаковці разом з препаратом. Препарат слід застосовувати натщо – для кращого всмоктання дії препарату. Сироп, що містить цукор, не рекомендується для застосування у пацієнтів, страждаючих спадковою ф. ф. ф. Для кожного разового дозування слід дозувати ліки, що містить цукор.

Підлітки (віком від 12 років)

дозу дитячої ваги слід не перевищувати дози
або 5 г разом на добу.

Для дітей добова кількість не має не перевищувати 40 мг/кг, для слід розділити на 3-4 прийоми, як описано в таблиці нижче (для в таблиці приведено не добова доза для дітей з вагою 40 кг і віком до 15 років, не обмежуючись нижче).

Для однократного прийому добової дози препарат можливо, що на 1 кг ваги тіла дитини приходить і 40 препарат, що знаходиться в 1 мл сиропу. Для дитини з вагою 40 кг, що дорівнює 40 мг/кг, можливо в 1 мл сиропу на добу, що перевищує добу. Для розкриття разової дозе добову дозу слід розділити на 3 прийоми.

Бруфен®, сироп: до 10 мл, не рекомендований для застосування у дітей віком (на вагою 7 кг).

Вага тіла	Кількість Ібупрофену (мг/кг)	Кількість Ібупрофену (мг разові)	Частота застосування (разів на добу)
7	40,7	1,5	2 рази
8	40,0	2	2 рази
9	37,8	2,5	2 рази
10	37,5	3	2 рази
11	36,4	3	2 рази
12	35,7	3	2 рази
13	34,6	3	2 рази
14	34,1	3	2 рази
15	33,3	3	2 рази
16	32,5	3	2 рази
17	31,8	3	2 рази
18	31,1	3	2 рази
19	30,5	3	2 рази
20	30,0	3	2 рази
21	29,5	3	2 рази
22	29,0	3	2 рази
23	28,6	3	2 рази
24	28,2	3	2 рази
25	27,8	3	2 рази
26	27,4	3	2 рази
27	27,0	3	2 рази
28	26,7	3	2 рази
29	26,4	3	2 рази
30	26,1	3	2 рази
31	25,8	3	2 рази
32	25,5	3	2 рази
33	25,2	3	2 рази
34	25,0	3	2 рази
35	24,7	3	2 рази
36	24,5	3	2 рази
37	24,3	3	2 рази
38	24,1	3	2 рази
39	23,9	3	2 рази
40	23,7	3	2 рази

Діти віком до 6 місяців: якщо симптоми посилюються або збереження довше ніж один від початку лихоманки, слід звернутися до лікаря. Якщо ви не впевнені, що ваша дитина 6 місяців, слід звернутися до лікаря. Якщо ви не впевнені, що ваша дитина 6 місяців, слід звернутися до лікаря.

Пацієнти з порушенням функції нирок. Пацієнтам з помірним або середньої тяжкості порушенням функції нирок слід застосовувати ібупрофен у зниженій дозі. Пацієнтам з тяжкими порушеннями, необхідному для контролю симптомів, та слід контролювати функцію нирок (наприклад в тяжкою нирковою недостатністю або при ренал-гіпертонічною хворобою).

Пацієнти з порушенням функції печінки. Для пацієнтів з порушенням печінки, що перебувають на тривалому лікуванні, необхідно контролювати функції печінки. Для пацієнтів з тяжкими порушеннями функції печінки, що перебувають на тривалому лікуванні, необхідно контролювати функції печінки.

Пацієнти з порушенням функції серця. Ібупрофен у високих дозах (2400 мг) може спричинити тромбоз. Ризик тромбозу у пацієнтів з серцевими проблемами, а також у пацієнтів, які мають високий ризик тромбозу, ймовірно, знижується, якщо ібупрофен вживати у дозі, що не перевищує 1200 мг на добу. Ризик тромбозу у пацієнтів з серцевими проблемами, а також у пацієнтів, які мають високий ризик тромбозу, ймовірно, знижується, якщо ібупрофен вживати у дозі, що не перевищує 1200 мг на добу.

Пацієнти з серцевими проблемами. Ібупрофен може спричинити затримку рідини, гіпертонію та набряки. Ібупрофен може спричинити затримку рідини, гіпертонію та набряки. Ібупрофен може викликати гіпертонію та набряки. Ібупрофен може викликати гіпертонію та набряки, що ймовірно пов'язано з ібупрофеном, особливо у пацієнтів з гіпертонією, а також у пацієнтів, які мають високий ризик тромбозу, ймовірно, знижується, якщо ібупрофен вживати у дозі, що не перевищує 1200 мг на добу. Ризик тромбозу у пацієнтів з серцевими проблемами, а також у пацієнтів, які мають високий ризик тромбозу, ймовірно, знижується, якщо ібупрофен вживати у дозі, що не перевищує 1200 мг на добу. Ризик тромбозу у пацієнтів з серцевими проблемами, а також у пацієнтів, які мають високий ризик тромбозу, ймовірно, знижується, якщо ібупрофен вживати у дозі, що не перевищує 1200 мг на добу.

К. На початок

03 ПРОТИПОКАЗАННЯ

- **Відома гіперчутливість** до ібупрофену або інших компонентів препарату.
- **Наявність в анамнезі** бронхіальної астми, кропивниці, алергічних реакцій, ангіоневротичний набряк або кропивниці у відповідь на прийом ацетилсалицилової кислоти або інших протизапальних засобів (НПЗС).
- **Підвищена схильність до кровотечі** або активна кровотеча.
- **Тяжка печінкова недостатність.**
- **Активна чи в анамнезі рецидивуюча виразкова хвороба** шлунка/кишечника/кровотеча (2 або більше окремих епізодів язвенного ураження або кровотечі).
- **Шлунково-кишкова кровотеча** або перфорація в анамнезі, пов'язані з попередньою терапією НПЗС.
- **Тяжка серцева недостатність** (класифікація Нью-Йоркської асоціації серця (NYHA) II).
- **Тяжка ниркова недостатність** (клубочкова фільтрація до мл/хв).
- **Тяжкі захворювання** (гіпертонічна болезнями, ідіопатичні або виражений ризик кровотечі).
- **Третій триместр вагітності.**
- **Порушення згортання крові.**
- **Серцева недостатність.**
- **Ідіопатичні гематологічні** кровотечі.
- **Ідіопатичні** кровотечі або отримання крові.

К. На початок

04 ФАРМАКОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Фармакодинаміка. Ібупрофен є нецільовим речовиною нестероїдним протизапальним засобом (НПЗП), який чинить протизапальну, знеболювальну та жарознижувальну дію. Механізм дії ібупрофену, як і інших нестероїдних протизапальних засобів, полягає у регуляторним пригніченням ферменту циклооксигенази, що перешкоджає до синтезу гормонами сигнальної регуляції. Ібупрофен є неселективним інгібітором ферментів циклооксигенази 1 і 2 форм. Ібупрофен може конкурентно пригнічувати вплив ацетилсалицилової кислоти на агрегацію тромбоцитів, коли обидва вживаються одночасно. Ібупрофен, у високих дозах, може знижувати ризик тромбозу у пацієнтів, які мають високий ризик тромбозу, ймовірно, знижується, якщо ібупрофен вживати у високих дозах, що перевищують 1200 мг на добу